



Ex Libris



Dón Steffensen





614.47

Jón

Kúabólu-setningu og Bólusótt

fyrir

Almúga á Íslandi.

Prentaðar í Vidéyar Klaustri á opinberan kostnað 1840.

Það er flestum kunnugt, hvorsu mikinn mannfellir bólusóttur opt hefur gjört á Íslandi á fyrri ældum, hefur hún nærst eptir drepóttina miklu 1402 og 1495 verið sú mannstjæðasta sem hét. hefur geingid, og síðan 1291, þá hún í fyrsta sinni kom hínag, hefur hún geingid 22ar sinnum, ýmist yfir allt, edur mikinn hluta landsins, og eitt sinn, nefnil. 1707 drepid 18000 manns. Nú hafa lidid yfir 50 ár síðan hún kom hér seinast, og er það kúabólu-setningunni að þakka, sem um flest lönd, hvar hún var innleidd, gjörpddi henni um tíma, og enn nú, hvar hún er réttilega brúfud, hindrar hana að mestu edur öllu.

Þar nú svo óhappalega hefur tilviljad: að franskur Matró, hafdi í fyrra komid henni inni Vestmannaeyar, og hún þadan hefur dreifst víða um suðurland, er ei ör: vænt hún útbreiddist um allt land, hvar ekki er því betur kúabólusett, vil eg því fyrst stuttlega gæta um ýmislegt við: víkjandi kúabólusetningu, sem af allmörgum er allt ósmjög vanhýrð, og víða hvar um mörg ár aldeilis lægd fyrir ofurbord.

Í Sunnanpóstinum 1836 í Júlí máuudi, hefi eg stuttlega drepid á, hvorsu naðsynlegt væri, að endurnýja kúabólusetningu eptir nokkur ár, einkum þegar von er á bólusótt, því það er satt og víst, að hún er það besta meðal sem nokkurn tíma hefur verið uppfundid til að varna bólunni, og það

einasta áreiðanlega; eg vil því vona og óska: að allir Prestar, hvörjum það einum er á hendur falid með Descr. af 10da Mars 1830, að setja kúabólu, og aðrir þeirra tilsettu meðhjálpendur, láti sér ant um að útbreida hana allstadar um landid, áður enn bóluþóttin kemur, því með því er hægt að komast hjá bólunni, en ekki alltítt hægt að lækna hana þegar hún er komit.

Fyrst er til að taka um börnin, að þau yrðu öll bóluset, og þeir eldri, sem kúabóla aldrei hefur sett verid, eða komid út á, er og naudsýnlegt að setja þeim fyrst, til þess að gæta af þeim feingid kúabólu efni, til að endurnýja kúabólusetninguna á þeim eldri, því aldrei skyldi setja af þeim sem kómur út á í annað sinn, þar kúabólan skjaldan verður að gagni í þeim til að setja af; veit eg til, að nokkrir kúabólu; setjarar hafa flaslad á því, að þeir hafa halbid að einu gyldei úr hvörjum sett væri, ef að eins kjami út á þeim, þó væri í annað eða þridja sinn, enda kómur skjaldan út hjá þeim á nokkrum manni, því eins og ein kúabólusetning ver vísan tíma að öllu fyrir bólunni, og þar eptir ennú leingi gjörir hana linari þó hún komi, eins verður kúabólan sett í annað sinn jafnvel eptir lánagan tíma, lángrum linari og kraptniuni til útbreiddlu, heldurenn úr þeim sem í fyrsta sinn eru kúabólusettrir.

Skroprugast er kúabólu efnið úr stálpuðum, heilbrigðum börnum, eða fullorðnum sem aldrei áður hefur komid út á, má og vel setja af úngbörnum, því öllum sem eru víku: eða $\frac{1}{2}$ mínadar gömul ætti að setja, þegar bóluna er að óttast. Einnleidis má setja börnum þó þau hafi kláda eða kresdu, en verra er að setja af þeim í adra, ef annars er kostur, og það er nokkud að mun.

Áðferdin að setja kúabólu, ætti að vera flestum kúabólusetjum kunnug, þó óttast ea, að allir séu ei jafnliprir í að setja af þurrum stöfum, og slá þeir þá alltítt skuldiinni uppá stöfurnar, að þær séu ónýtar, þó þær hafi vel komid út hjá mér.

Þegar setja skal af skorpu, skal fyrst tálga hana niður í heinbolla, svo hún verði salla smá, síðan skal merja hana enn betur, með, andhyvört járu; eða tréshnúð hordum og hreinum, sem sé hástóttur fyrir endanum; Þegar hún þá er orðin smámulin sein hveiti, skal láta drjúpa 1—2 eða mest 3 dropa af vatni, (eptir sem skorpan er stór) í mysluna, hræra enn nú vel saman með stantaranum, svo verði sem þykk kvoda, lóðir þá gjarnan mikild af því við stantarann, og má eins af honum taka á nálina.

Þegar búid er að stinga með nálinni, vill vefsinn sérast upp eptir henni, og verða fyrir utan sáríð, skal þá með oddinum taka hann aptur, og sæta inni sáríð; aldrei skal stinga innávið í holdið, heldur slá milli stíuns og hörunds, svo ekki blæði, heldur að eins blóddropi sitji eptir í gatinu; þá er máttur lega djúpt sett, ef að eins má telja stingina þegar búid er að setja; 3 eða 4ra stóldi setja á hvern handlegg; best er að setja að innanverðu á upphaudleggina, því þar kemur best út.

Að setja af lifandi kúabólu, veit eg allir kunna sem til þess eru settir, má setja af henni 8da til 11ta dags þegar vel hefur komið út, og ekki hefur risnað ofan af bóluinni, sem mikild ríður á, að vel sé passað, því kúabólunnar verkun verður minni ef rífið er af þeim, og allur vefsinn rennur út, líka verða stundum sár af því, sem leingi gresur í.

Allir sem kúabólusettir eru, ættu því að forðast að rísa af bóluinni, eða klóra þær, heldur vera í svo víðum ernum sem þeir hafa fangið á, og þeir sem brúka ullar; skyrur, ættu að vessa lérept; ríu um þann hluta handleggjanna, sem bólusettir voru, og hafa bundna þarum, svo ekki strjúkist skyrtau fram og aptur um þegar stöða þarf; líka klær langtum minna, ef lérept liggur við hörundið, enn undir ullardúk.

Þar við varðveitast og skorpurnar best, og rýnast síður, sem allar ættu að haldast saman, og stífast bólusetjaranum, af þeim sem í fyrsta sinn er sett kúabóla, því þær má leingi geima, og senda lánga vegin, vafar í lifnabelg, eða látnu

ar í glæs, til að planta kúabóluna á aðra stadi, og koma henni á gang, eptir marga mánuði. Af þeim sem kúabólun kemur út í 2ad eða 3ja sinn, brúfast skorpurar ekki, sem áður er sagt.

Því fleiri börn sem eru ókúabólusett í einu héradi, þess hægra er að útbreidda í þeim kúabólu, og viðhalda góðu efni, og munu án efa víðast hvar nokkur finnast.

Af eiani kúabólu hefi eg sett yfir 80 manns, og má þaraf sjá hvað marga má kúabólusetja af einu barni sem hefur 6 eða 8 bólur; þegar vól er á fleirum, opna eg aldrei allar bólur á sama barni, heldur einasta 1—2 eða 3, og læt það halda einni eða 2ur óþrændum, svo það ei missi ósmikinn vessa.

Nú spyrja menn, hvörja á að kúabólusetja í annað sinn? og er þá óhultast að svara: alla þá sem lídud er leingra enn 5 til 8 ár síðan þeir voru kúabólusettir sem börn, svo út hafi komid. Það er stadreint, að því yng: ra sem barnid var, þegar því var sett í fyrsta sinn, þess fljóts ar þarf að endurnýja kúabólusetninguna. Eg hefi sett 5 vetra börnum, sem bólusett voru á fyrsta ári, og hefur komid út á þeim, sumum vel; en hafi þau verid 5 eða 6 vetra, þegar þeim var sett í fyrsta sinn, kemur optast ekki út, fyrri enn eptir 7 eða 8 ár, og hafi þau verid 10 vetra, edur eldri þá enn seinna.

Vísast verdur að reyna, að kúabólusetja alla sem sett hefur verid fyrir 1835, því þó ekki komi út á öllum, kemur út á velflestum, og á því fleirum, þess leingra sem lídud er frá því þeim var áður sett; Þaðspnlegt er og um leid, að líta vel eptir hvört allir þeir hafa góð or, sem þykjast vera bólusettir fyrir flémsku, því eg hefi orbid var víð að margt fullorðid fólk, hefur eingin kúabólu or, og veit ógíðla, hvört nokkurn tíma hefur komid út á sér að gagni eða ekki; Þessa alla ríður mikid á að kúabólusetja, hvenær sem þeim svo hefur sett verid.

Eg hefi í sumar sem leid, og í vetur fundid um 20 af fullordnu fólki, sem kúabólan aldrei hafði komid út á, og höfðu þó jafnvel sumir af þeim kúabólu; attest.

Allir þeir sem kúabólan verkar á, hefðu gétad feingid meir edur minna af bólanum, hefði hún komid í þá fyrri enn kúabólan.

Gamalmenni, sem áður lifðu, þegar bólan gekk og lán í henni 1785 fá hana eins aptur, og fleiri hafa dáið af þeim, höfðu þeir ekki látið kúabólusetja sig, því þeir væntu að sleppa hjá bólunni, af því þeir höfðu feingid hana einusinni, en það er alfunungt, bæði hér og utanlands, að þegar mjög langt lidur á milli þess bólan geingur, fá sumir hana 2ar, og er þá ekki von að kúabólan vardveiti æfilángt, þegar hin gjörir það ekki.

Í Stórubólu 1707 dóu margir er feingu bóluna í annað og 3ja sinu.

Þar sem bólan hefur geingid hét sunnanlands, má sjá hvað kúabólusetningin hlífir við henni, því eptir því sem hún hefur þessud verid á hvörjum stad, hefur orðid minna edur meira af bólusóttinni.

Undir Eyafjöllum var strax í vor, vel kúabólusett af Monfr. Magnúsi Jónssyni á Gólaftoti; hvarf bólan þá strax þadan, og lagdist einginn, sem kúabólan hafði komid út á; þar á móti í Utstála sókn var ekkert af fullordnu fólki, aptur bólusett, nema nokkrir í Ræblavík, er eg setti í sumar er leid, og mörg börn óbólusett, enda dóu þar yfir 40 manns af sóttinni, þar af hécumbil helmingur börn, af 600 fólks fjölda. Híngad til Reykjavíkur kom bólan í Octóber, og darp eitt ung barn óbólusett og móður þess fyrri enn eg af víði.

Í Sumar er leid, hafði eg um lángann tíma bólusett, einusinni í hverri viku, og kunnngjört daginn með skrifudum sedli uppslegnum á fyrkjunni, komu optast nokkur börn sem sett vard, rímt 100 í allt um Sumarid, og baud eg um

leid að endurnýja bólusetninguna á þeim eldri, en fáeinir þekktu það, helst Kaupstadar fólk, en fáir af hverfismonnum; Eptir að bólan nú var komin fyrir austan Kaupstadinn, útbreiddist hún meir og meir, drap þá 6, óvaccinerud börn, sem Foreldrarir höfðu forðmað að láta bólusetja, og nokkra karlmenn aldrada, hvar af 2 hófðu áður lifað bólu, annar 70tugar, annar víð Stugt, sem allir höfðu verið gefnir fyrir brennivins driffla, og mun það ekki hafa gjört bóluna vægari; 2 kvenmenn dóu og sem eg veit ei hvort nokkur tíma höfðu verið klúbólusettar.

Nú tólu menn eptir, að all þau börn sem sett hafði verið í sumar, og þeir fáu sem klúbólusetningin hafði verið endurnýjud á, eða sett hafði verið fyrir fáum árum, allir sneiddust úr, og feingu augva bólu, þó þeir væru í húsum hvar bólan gekk; vildi þá margt fólk láta setja sér klúbólu, varð eg strax víð bön þeirra, og setti fyrir Jóliu yfir 160 klúbólu, og um, og eptir Mhárid, jafmörgum, og í Safnarfirði, hvar fólk var langtum viljugara að láta setja sér klúbólu, setti eg um sama mund yfir 300 manns, enda hefur þar enn nú eingin bóla komið, og hér í Reykjavík, hefur hún smáminnkad síðan um Jól, og nú í $\frac{1}{2}$ mánuð, einginn dáid og einginn lagst að nýu, og allir sem enn liggja, eru í apturbara; sýnist því sem hún muni þegar hætt, og má ei kalla hún hafi vordid hér slæm, hvar yfir 1200 manns er saman komið í einni sókn, lokust var hún í December.

Einginn af þeim sem eg hefi klúbólusett í þetta sinn, og hún verið komin úr á, hefur feingid bólusött, óttadist eg þó, að bólusöttin væri komin í suma ef sett var, en ef klúbólan kom út á þeim, áður þeir veiktuft, kom eingin bóla í þá, 3 voru lasnir þegar þeim var sett, og kom bólan út á þeim, eptir 1 og 2 daga, en bátnaði aptur. Klúbólan fór þá lítin frapt, ef hún er komin í mauninn áður, sem opt gétur verið 14 dögum fyrr enn hún meikist, en spillir þó ekki,

því er betra að kúabólusetja í tíma, áður enn bólusóttin er komin á hvörn bæ, eða í hverja sólu.

Hér eru, einsog víðar annarstadar, ekki allsáir af þeim heimslusullu, sérvitrings dárnum, sem hlæra að öllum flinsamlegum tilraunum, stæra sig af, að þeir hafi aldrei á æfi sinni verið kúabólusettir og þeir séu ekki svo hræddir við dauðann eins og hi.ir sem láta kúabólusetja sig, og hafa nokkrir af þessum látið lífið fyrir gífshátt sinn, aðrir leigð leingi, og þunglega, og er líklegt að aðrir láti sér þeirra víti að varnadi verða.

Eg vona því, að sannfæring sú, er við höfum hér umkring af reynslunni, styrki aðra í trúnni, sem sner búa, og til hvorra sóttina enn ekki er komin, svo að allir, úngir og gamlir brúki þetta óbrigðula varnar meðal í tæfann tíma.

Það er lítið ómál, þó menn ættu sta eða íöðla hvort ár að endurnýja kúabólusetninguna, helst þegar bólusóttina er að óttast, því hefur heidur aldrei verið heitid, að hún sthyldi vardveita alla æfi óendurnýnd, því Dr. Jenner sem fann uppá henni, seigir „hún er óbrigðult meðal að varna bólunni eptir sem hingat til hefur reinfst, en hvort hún nægir einusfuni fyrir lángann aldur, veit eg enn þá ekki, það má tíðin og mínir eptirfomendur, af reynslunni sanna.“ Og nú vitum við að hún er eins áreiðanleg, eins og hún var þá, en þarf að endurnýjast eptir nokkur ár.

-Um Bólusóttina.

Bólusóttin byrjar í sprengu, líft og aðrar landsarsóttir, með höfudverk, optast stríðum verki yfirum mjóhregginn — sem er bólunnar einkenni — hryllings stjálsta og síðan brúna hita, með þorsta, beinverkjum, og lífri tilfinningu, sem allur líkaminn sé murinn. A 3ja eða 4da deigi slær út smáum, raudum bólum, sem síðan hvítu í kollinum,

um andlitid, brjóstid, höfudid og hálsinn, og smátt og smátt um allaun kroppinn, er það mjög misjafnt bæði hvað miðid nær út, og hvornin bólunni er varid. Sumir sem kúabólusetir voru fyrir 10 til 20 árum, fá oft litin útslátt, edur jafnvel eungvann, ef þeir hafa svitnad vel, og verður lítid úr sóttinni, sem endar með hroðas útslætti, helst um höfudid, og eru strax frískir eftir 2 eda 3 daga. Á þorum sem langt er síðan þeir voru kúabólusetir, verður útslátturinn meiri um allann kroppinn, og mismunnar þá strax hvört bólurnar standa adgreindar hvor frá annari, eru uppháfar, og holdid ekki bólgid nidurá milli, er það betri bólutegund (*Variolæ discretæ*) heldurenn ef allt holdid þrútnar og bólur jafnt, svo allar bólurnar hlaupa saman í hellu, og verða óvita adgreindar, kallast það hellu : bóla (*Variolæ confluentes*) og er hún verri enn hin fyrri.

Þegar bólan er komin út, léttir optast sóttinni í kroppnum nokkud, og sumir, sem höfdu góð kúabólur or, fá þá strax matar : lýfi, og fara eftir fáa daga á sætur.

Aðrir sem aldrei, eda fyrir mjög laungu voru kúabólusetir, og þá úngbörn, hafa altaf nokkra sótt, sækir þá og oft svefuleysi og harðlífi, verður bólgan svo fjarfka mikil ad augun geta ei opnast, og allt andlitid og líkhamiun affræmist, hálsinn og munnurinn bólgnar ad innan, og bólur koma á tunguna og í hverfarnar, svo þeir geta varla eda ekki rent nidur; allur kroppurinn verður stundum skinnlaus, einkanlega þegar bólan verður hellubóla, og bólgan svo fjarfka mikil, ad skinnid springur og rotar af, verður þá allur kroppurinn eitt skinnlaust bólgu : stykki, með óþolandi svida, hvor úr vellur sífelðlega, illa lífrandi vilfa — þ. e. **Vora bóla.**

Meun skipta tíðinni er bólan varir, gjarnast í 4a parta hl. fyrsta tímabil er sóttarumleitunin, þar til bólunni nær út, sem varir optast í 3 daga; annad, eda útsláttar

tímabil, meðan bólan er að slá út, sem optast fléður á rúnum beigi, varir þó stundum í 2 til 4 daga; Þriðja er ígérðar tímabilid; byrjar optast þann 9da dag frá sóttarinnar byrjun, ver þá að nýu hafsubverkurinn, beinverfir, og hiti í kroppnum, stækka þá og bólurnar aptur og verða græstarlitadar í kollinum — áður er vesinn flár og gégns umfar í þeim — andlitid bólgnar þá enn meira enn áður, og á ýmsum stöðum um kroppinn, hvar bólan var mest komin út, ver bólgan, en eptir sem græsturinn rennur úr bólunum, linast hún aptur, og sóttin sjálf með; sumar bólur sem minni eru, þorna upp og vísa, án þess úr þeim renni, opt kómur spíttingur mikill og sárindi í munni inn á þessu tímabil. Þessu fylgja því og stundum hafsubótar og svefnleysi.

Ígérðar sótr, sem er sú hættulegasta fyrir þá, er aldrei voru kúabólusettir, og deydir marga af þeim, verður alment minni á þeim sem einhvorttíma hafa verið kúabólusettir; á morgun af þeim minnar sóttin algjörlega þegar bólan er komin út, og kómur aldrei aptur; bólurnar eru vesna minni, og þorna upp af sjálfu sér, og falla af sem hreiftur án þess þeir fái neina tölverða ígérðarsótt.

Evoleidis hefi eg sjed einn mann yfir 40ugt sem hafði verið kúabólusettur fyrir 34m árum, hann fékk sterka bólusótt, og bakverf mikinn, sem linadist við blóðtöku; á 3ja degi var hann allur útsleginn, og tölverðt bólginn í framan, og í hálsinum, en strax eptir 2 daga, fór bólan að þorna og minna, án þess hann feingi minstu ígérðarsótt, fékk matarlyst, og komst á fætur eptir fáa daga; á þessum var auðhjedd, að kúabólan ennú eptir 34 ár, linadi mikid sóttina, því mikid minna varð úr henni, enn útleit fyrir í fyrstu, og batnadi langtum fljótar heldurenn jafnmikil bóla, á öldungis ókúabólusettum plagar að gjöra. 4da er hreiftur unartímabil, þegar bólurnar þorna og detta seinast af sem hreiftur, bólgan minnar allstadar smátt og smátt, fá veiki

svitnar af sjálfu sér, og fær hægan uppgang stá brjóstinu; Þessi tímabil vara ekki á öllum jafn leingi, einum þau 2 seinustu, því liggja sumir í fáa daga, aðrir í jafnmargar vikur. Einn sem var 30tugr og hafði verið kúabólusettur, nokkurra vikna gamall, lá í 6 vikur þungt, og fékk svo þunga bólusótt og bólgu, að kúabólunnar verkun, sýndist að hafa tapad sínum krapti algjörlega, nema ef vera skyldi, að hann þó lifði, og batnadi á endanum, því hann sýndist optar aðfominn dauða, héldt eg að kúabólan hefði fyrir laungu tapad svo miklu af krapti sínum, af því hann var svo mjög úngur þegar honum var hún sett.

Medferdin á bólunni er nú nokkud ýmisleg eptir sem hún hagar sér, enda koma stundum skjaldgjaf tilfelli sem þurfa sérlega medferð. Eg vil stuttlega gera þess sem vanalega er brúfad, og flestir þurfa við.

Þegar bólusóttin gripur einu fullordinn með miklum hæf; udverk og stríðum bakverk, er best strax að taka blóð á handlegg, sérdeilis ef bakverkurinn er svo mikill sem taf væri; skjaldan hefi eg tekið blóð optar enn einusinni, þó má það vel vera í annad sinn, ef verkurinn ekki linar við fyrstu blóðtöfu, helst ef blóðið er með hvítri seigri slán of; aná í fyrra sinni. Þar eptir er optast gefið eitt laxérmed; al t. d. 3 til 4 lóð af laxersalti, uppleystu í heitn vatni. Børnum má gefa minna eptir aldri eða þá theevatu af senneblöðum, eða eitthvört annad vanalegt laxérmedal.

Þarnaft er gott að láta þann veifa altaf svitna við og við, þangad til bólunni slár út, því bæði verður útslátturinn og bólgan í holdinu vægari við það, og enda á sumum, sem fyrir 15 eða 16 árum hafa verið stálpadir, kúabólusettir, hefi eg orðið var við, að hafi þeir svitnað vel, verður ekki mikil úr bólunni, og jafnvel á sumum, hefur eingin bóla komið út, og þeir hafa orðið heilbrigðir strax eptir að hafa svitnað í 3 samfleytta daga. Þó mun það ekki eiga heima hjá öðrum enn þeim, sem

kúabólan hefur ennú tölbuverðan frópt í, og verður þá jafnan lítið af bóluþóttinni í þeim, hvornig sem með er farid, enda grípur hún þá ekki svo ákaflega sem hina, heldur fer með mikilli hægd, svo þeir aldrei líða stórar þjáningar.

Þess má strax gæta að öllum bóluveikum, eins og öllum sóttveikum, er ónifsandi að hafa hreint og gott loft hvar þeir liggja inni, er nauðsynlegt um sumar : eda vor : daga, að opna glugga daglega hvar þeir liggja, enda þó faldt sé í vedri má það vel gjöra litla stund í einu, og breiða vel yfir þá fót á meðan, svo ekki komi kalður vindur að þeim; en á sumrum, má gluggi standa lengst af opinn um daga, ef ei blæs vindur beint á hann.

Til að svitna af, má brúka heita drykki t. d. vel heitt theevatn þúglega, ef sá veikni svitnar greiðlega, má það gjarnan vera vanalegt heitt blóðþergsvatn, Tongothes og þess; háttar, því hitinn alleina verkar svita, ef sá veikni er vel þakinn í fótum.

Þeir sem eiga ærdugt með að svitna, gæta tefid Chamforudropa 80 í einu, eda Chamforu : brennivín nefula. 1 lóð Chamforu uppleyst í $\frac{1}{2}$ potti brennivíns, og þar af gefin ein matskeið í einu, plagar að nægja flestum; hylde thee að drekka af, gæta og þeir brúkad, er það hafa eda gæta náð því.

Þegar bólan slær út, plagar sóttin að línast, og sá veikni að hressast í það minnsta um stund, þarf þá optast eingin meðal að brúka, nema að sjá til, að sá veikni hafi góðar hægar, því hardlífi vill gjarnan fylgja með sjúkdóminum eptir að bólan er komin út; Stólpipa er þá góð ef hann er þungt haldinn, sé hann það ekki, má brúka opnaudi meðal af þeim áður tölou.

Verði bólgan fjarsta mikil í andlitinu svo augun lokist, er nauðsynlegt að væta riur í feldu vatni, og leggja yfir þau opt á dag, til að skjæla og mykja bólguna í augnalok;

unum, séu fáar bóluir í hnakknum, má þar og leggja spansflugnaplástur, en sé hann mjög þakinn bólum verður það ekki. Safnist bólan mest í andlitid og höfuðid, en lítid á útlíminja, lukkast stundum að fá hana til að slá út á fótum og handleggjum með því, að nudda þá uppúr heitu vatni, passa að fæturnir séu vel heitir, jafnvel færa þá í ullar sokka, og ef effért slær útum þá að heldur, leggja spansflugnaplástur aptaná kálkana, því það léttir frá höfuðinu og augunum, ef jafnt slær útum allann kroppinn helst útlímina.

Bólga og eymsli í hálsinum, fylgir alment tölurverðri bóluþótt, kénur það af bólum sem þar sitja, við því er gott að vefja hálsinn í ull, sem sé heit og þur, og innvortis brúka hreint himáng, 1a theesfeid í einu nokkrum sinnum á dag til að mýkja sárindin í hálsinum; verði hálsinn svo slæmur, að fá veikni gæti ekki rent neinu niður, má brúka stólpípn til að halda við hægðum, bada hálsinn utan með volgu vatni, og leggja svo heitann ullarbakstur yfir.

Á þeim sem sóttin eykst aptur, eptir að bólan er komin út fyrir nokkrum dögum, og er það þá af ígérðarþótt, er gott að brúka fjælandi meðöl, svo sem fjælandi púlvur 1a súffulla theesfeid í einu í vatni hvörn eiftartíma, eða fjælandi mirtúru er svo kallast (Mixt: acid: mineral:) til að blanda með vatni, 2 til 3 matsfeidar, og drekka sem svaladríkk, má og brúka saltþétur mulinn og uppleyst; ann í vatni, 2 lóð í potti, og taka þar af 2 eða 3 matsfeidar á eiftar: fresti.

Suma sækir svefuleysi mikid, er þá höllt og brúka heitt fótabad, og nærji það ekki, má með varúð brúka svefnudropa, þó helst eptir Látnirs fyrirskrift, án hværar þeir ekki súst keyptir í Apóteki; þeir eru annars ómíssandi meðal að háfa, hvar mikil bóla geingur, og hjálpa ágætlega vel, með gjætni brúkadur, hvar svefuleysi er mikid, órót í kroppni

um og útiúr svefnleysinu koma höfudórar þegar það varir leingi. Sömuleiðis passa þeir þeim sem fá sínadrætti, sem stundum fylgja ofstæðu bólgu í hálsinum og andlitinu.

Nú verður stinnid stundum svo spent og aumt af bólgu unni, að fá veiki þolir ekki að láta snerta það, má þá bera á það mjúka feiti, t. d. nýstrokkað ósaltad smjör, til að mýkja bólguna; líka sitja stundum hardar og þurrar skorpur á bólgn holdinu, sem springur af þurf og hita á milli hrúdranna, má þá bleyta þær upp með volgri mjólk, edur rjóma, hvar við stinnid mýkist um leið; mikill spíttingur í munninum er gott merki, og má hann ekki hindra, en ef hann af sjálfum sér hættir fljótlega, og hverfarnar bólga þá meira, skyldi halda munninum opnum yfir gusu af heitu vatni, til þess aptur að ærfa hann og vatnsrenslid af hálsinum.

Það ber við í bólunni, að túngan er mjög óhrein og hulin þykkri, gulleitri skorpu, má þá, ef það er í byrjun sóttariunnar, áður enn bólan er komin út, gefa þeim veika uppsölu medal, í stadin fyrir, að laxermedal er brúkað annars þegar túngan er hrein og raud; verði nú túngan mjög óhrein seinna í sjúkdóminum, má og gefa uppsölu medal, ef eingin eda lítil bólga er í hálsinum, en sé mikil bólga í honum, og sárt að tenna niður, er betra að brúka laxermedal, og komi blóð úr hálsinum, má alls ekki brúka uppsölu medal, og það yfir höfud í bólusóttinni er stjaldnar brúkað, enn í öðrum landsfarstöttum.

Á einstaka manni byrjar sóttin með höfudórum áður enn bólan kemur út, má þá og líka taka blóð, brúka heite sóttabad, en leggja kalda, vatnsvota flúta við höfudid, og jafuvel leggja spanska plástur aptan á kálfana, brúka innvortis fjælandi meðal, nefnir. Fjælandi pulver, vínstein, eda saltpetur.

Það er hættulegt, ef bólunni flær inn aptur fljótlega, eptir að hún er komin út, þekktist það af: að bólurnar

mínka skyndilega, eða hverfa, og vestur þá sóttin innvorts ís um leið; ýmist koma þýngsli fyrir brjóstið, höfudverkur mikill og höfudórar, eða jafnvel hvarfvegga þetta til samans, þá er það besta ráð, að reina til að láta þann veika svitna svo fljótt sem verður með Tamsóru og heitum drykk, sem áður er umtalad, þvo og nudda kroppinn upp úr volgu vatni, og leggja spanáflugna plástra á handleggji og fætur.

Ýmislegar umbreitingar geta að sönnu komið í bókunni, sem hér yrði oflangt upp að telja, og máské nokkud ófölgjanlegt fyrir marga, sem ekki eru sjúkdómnum vanir, er það ein sú helsta, þegar bólusóttin verður að rotunnarsótt, er hún þá mjög hættuleg, með sífeldum höfudörum, sjarfla mikilli bógu, eða bólu; útslatti, með bláleitum flekkjum, svo að þegar þær þörna, sortnar allt holdið, og verður dökkleitt (*Variolæ nigræ*) þá er nauðsynlegt að brúka síra drykki; þeir sem því geta náð, ættu að brúka brennisteins-sýru (*Acidum Sulphuricum dilutum*) sem blanda má í kaldu vatni svo það verði mätulega súrt, og láta þá veifu drekka það sem svaladrykk, eða þeir sem eiga kost á að nálgast þá síru fjalandi Mirturu, hvórrar áður er getið; Í matsfeidar annauhvörn tíma má taka af henni í fólgu vatni. Kalda vatns bakstra, skyldi og leggja á höfuðið við þá, er svo eru, sem til loftu eru fáir, nema ef vera skyldu aldeilis ófúabólusettrir, því ekki hefi eg sjed hana svo vonda í öðrum enn þeim.

Ýmisteg fylgi þess, kómrur eptir bólusóttina þegar hún er botnud, ein sú helsta er kyli hingat og þangat um kroppinn, einum undir höndum, meiga þau meðhöndlast einu og hvor önnur kyli, nefsalega: leggja völgar mýkjandi bakstur við þau, þar til þau, annadhvort grasa út af sjálfu sér, eða spreitta má í þau, og hleypa út vognum, brúka síðan sára-salve, edur annad þessháttar, sem vanalega er brúkad við útgrafnar ígérdir.

Mataræði þeirra bóluþjúka, má vera nokkud miðjafnt, eptir sem sóttin er mikil; þeir sem hafa lítilsjórlega bólu, geta alltaf næstum því borðað allan mat, þó er ekki ráð;legt að gefa þeim fjörmat, fyrr enn þeim er töluerðt batnad, og þeir hafa feingid góða matarlyst; vatnsgrautar og misa að drekka, er best fyrir þá sem hafa töluerða sótt, og sé túngan hrein, má gjarnan gefa þeim mjólk eða mjólkurmat; fjóst á betur við, eptir að þeir fata að hressast, og eru komnir á sætur.

Þegar einstakir menn í einu héraði, fá bólu og þar er ekki nýlega klubbóluþett um kríng, ættu allir að gjöra sér að flulbu, að varast, að bólan breiðist út frá þeim, sem má með því móti, að einginn af bæ komi, eða sitji inni hjá þeim bóluþjúka hvar hann liggur, og að allir sem ekki eru erindi hafa, forðist að koma þar inn, og mest ríður á, að sjálfir þeir veiku, eptir að þeim er batnad, fari ekki á aðra bæi, hvar bólan ekki er, fyrri ein allt hreistur er af þeim döttid, og öll söt, þau er nærri þeim voru, er þeir láu, eru vel þveigir, og síðan þurkud leingi í vindi. Þar til þénar líka, að þvo allan líkamann í volgu vatni, eptir að bóluhreistrid er döttid af, og það jafnvel optar einn einusinni.

Ektríad í Febrúar 1840.

af

S. Thorsteinsen.







